



Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% olie, 10 ml
Voor sublinguaal gebruik

Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u medicinale cannabis olie gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de apotheker van de Transvaal Apotheek. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 5 vermeld staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met de apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Medicinale cannabis
2. Waarvoor wordt medicinale cannabis olie gebruikt?
3. Wanneer mag u medicinale cannabis olie niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
4. Hoe gebruikt u medicinale cannabis olie?
5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?
6. Mag ik cannabis gebruiken met andere medicijnen?
7. Hoe bewaart u medicinale cannabis olie?
8. Inhoud van de verpakking en overige informatie
9. Dosereren cannabisolie

1. Medicinale cannabis

Cannabis bestaat uit de gedroogde bloemen van de vrouwelijke plant van Cannabis sativa L (hennepplant). Er wordt een onderverdeling gemaakt in cannabis sativa en cannabis indica soorten. Andere namen voor cannabis zijn marihuana of wiet. Cannabis bevat verschillende werkzame bestanddelen, zoals dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD). THC is meestal het hoofdbestanddeel, maar ook de andere inhoudsstoffen – zoals CBD – kunnen een bijdrage leveren aan de werkzaamheid. Cannabis die via de apotheek verstrekt wordt, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is alleen bedoeld voor gebruik als medicijn. Daarom spreken we over medicinale cannabis.

2. Waarvoor wordt medicinale cannabis olie gebruikt?

Er bestaan verschillende soorten medicinale cannabis, variëteiten genoemd. Deze variëteiten verschillen van elkaar in samenstelling en sterkte, en daarmee ook in werking. Van deze variëteiten zijn vijf verschillende oliën gemaakt met zijn eigen vastgelegde sterkte en samenstelling. Welke olie het meest geschikt is, hangt af van de klachten. Uw apotheker bepaalt samen met uw arts welke olie voor u de beste keuze is. De arts schrijft medicinale cannabis voor als gangbare behandelingen en geneesmiddelen niet voldoende helpen of te veel bijwerkingen geven.

Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml en Bedrolite CBD 2,0% olie, 10 ml

Er aanwijzingen dat cannabis met een hoog gehalte CBD en THC (zoals Bediol CBD 2,0%/THC 1,3% olie) goed werkt tegen pijn en spasmen, bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose (MS). Door de ontstekingsremmende eigenschappen van CBD geeft deze olie mogelijk ook betere effecten dan de andere oliën bij aandoeningen die gepaard gaan met ontstekingsreacties. Bij chronische zenuwpijnen start men vaak eerst met Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie en bij onvoldoende pijnverlichting stapt men over naar andere variant.

Bedica THC 2,0% olie, 10 ml

Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml

Cannabis met voornamelijk THC heeft de voorkeur bij aandoeningen zoals het syndroom van Gilles de la Tourette, therapieresistent glaucoom en bij klachten zoals gewichtsverlies, misselijkheid en braken. De Bedica THC 2,0% olie is een cannabis van de indica soort. Deze heeft naast de bekende effecten van cannabis, zoals vermindering van pijn, een extra sterke ontspannende werking op lichaam en geest. Dit kan voor patiënten die te maken hebben met onrust of spasmen een geschikte keuze zijn. De Bedrocan THC 2,0% olie is een cannabis van de sativa soort. Deze heeft net als de Bedica de bekende effecten van cannabis, zoals vermindering van pijn.

Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, 10 ml

Bij onvoldoende effect Bedrocan THC 2,0% of Bedica THC 2,0% kan de Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% worden toegepast.



Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% olie, 10 ml
Voor sublinguaal gebruik

Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml

De Bedrolite CBD 10% olie wordt toegepast bij de behandeling van epilepsie. Deze cannabis olie bevat minder dan 1% THC. De ongewenste effecten van THC ('high' worden) zijn hierdoor niet aanwezig. Deze olie is daarom ook geschikt voor de toepassing bij kinderen.

Is de werkzaamheid aangetoond?

Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat cannabis werkzaam is bij: Pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade; Misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids; Misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hepatitis C of hiv infectie en aids; Chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos); Syndroom van Gilles de la Tourette; Therapieresistent glaucoom

Daarnaast komen er steeds meer gegevens en positieve berichten van patiënten en artsen beschikbaar over de werkzaamheid van cannabis bij andere aandoeningen. Alleen zijn daarvan de wetenschappelijke bewijzen nog onvoldoende. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoïde artritis, ADHD en hersentrauma (zie ook www.cannabis-med.org). Medicinale cannabis speelt voornamelijk geen rol bij de genezing van de aandoeningen, maar kan wel de klachten van de aandoeningen verminderen. Ook kan medicinale cannabis helpen om de dosering en/of bijwerkingen van andere medicatie te verlagen/verminderen.

3. Wanneer mag u medicinale cannabis niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u medicinale cannabis niet gebruiken?

U mag geen medicinale cannabis gebruiken als u een aangeboren lang QT-intervalsyndroom heeft en aanleg voor psychotische stoornissen. Medicinale cannabis moet vermeden worden bij Brugada-syndroom omdat het kan leiden tot een afwijkend ECG. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met andere psychische problemen, bij hartritme stoornissen, bij angina pectoris en bij ischemische hartziekte. Voorzichtigheid is geboden bij glaucoom. Medicinale cannabis olie bevat geraffineerde arachideolie. Arachideolie, ook wel pindaolie genoemd, is een plantaardige olie die uit pinda's wordt gewonnen. Geraffineerde arachideolie is gezuiverd van pinda-eiwitten en kan in tegenstelling tot ruwe arachideolie gebruikt worden door mensen met een pinda-allergie. Ruwe arachideolie kan namelijk bij

sommige individuen met een pinda-allergie milde allergische reacties oproepen en dient vermeden te worden.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn?

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap: Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Werkzame bestanddelen van cannabis kunnen via het bloed het ongeboren kind bereiken. Sommige kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft gebruikt, hebben groeiachterstand, problemen met slapen, zijn hyperactief of hebben concentratieproblemen.

Borstvoeding: Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Werkzame bestanddelen van cannabis zoals dronabinol (THC) komen in de moedermelk terecht en kunnen dan bijwerkingen bij de baby geven.

Eten en drinken?

U mag alles eten. Vermijd het drinken van grapefruit sap. De opname van de werkzame stoffen kan namelijk worden beïnvloed. Voor een snelle opname in de bloedbaan dient u de cannabis olie onder de tong te druppelen. De smaak kan worden geneutraliseerd door olijven of een stukje banaan te eten na het druppelen onder de tong. De bittere smaak kan per flesje verschillen.

Alcohol drinken?

Alcohol en cannabis versterken en verlengen elkaars werking aanzienlijk. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Rijdt absoluut geen auto als u alcohol heeft gedronken terwijl u cannabis gebruikt.

Autorijden?

Per 1 juli 2017 is het voor gebruikers van cannabis wettelijk verboden om actief deel te nemen aan het verkeer, ook als er een medische noodzaak is. Dit verbod is niet van toepassing op gebruikers van cannabisolie die alleen CBD bevat (alleen de Bedrolite CBD olie). Voor gebruikers van Bediol, Bedica en/of Bedrocan geldt dat het bij wet verboden is om auto te rijden, ongeacht welke dosering gebruikt wordt. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website: <https://www.rijveiligmetmedicijnen.nl/>

Op reis

Medicinale cannabis olie valt onder de Opiumwet. In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiumwetmiddelen streng verboden. Gaat u op reis en wilt u uw medicinale cannabis olie meenemen, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Reizen



Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% olie, 10 ml
Voor sublinguaal gebruik

naar het buitenland zonder verklaring voor een medicijn dat onder de Opiumwet valt is namelijk strafbaar. Het CAK legaliseert deze verklaringen. Op de website www.hetcak.nl staat alle informatie over reizen met medicijnen die onder de Opiumwet vallen.

4. Hoe gebruikt u medicinale cannabis olie?

Meestal begint u met een lage dosering. Afhankelijk van het effect kunt u de dosering geleidelijk aanpassen. (zie paragraaf 9 voor het doseren in druppels of met een spuit)

- *Bedica THC 2,0% olie, 10 ml;*
0,05 ml = 1 mg THC = 2 druppels
- *Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml;*
0,05 ml = 1 mg THC = 2 druppels
- *Bedrolite CBD 2,0% olie, 10 ml;*
0,05 ml = 1 mg CBD = 2 druppels
- *Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml;*
0,05 ml = 1 mg CBD en 0.65 mg THC = 2 druppels
- *Bedrolite CBD 10,0% olie, 10 ml;*
0,05 ml = 5 mg CBD = 2 druppels
- *Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, 10 ml;*
0,05 ml = 5 mg THC / 2,5 mg CBD = 2 druppels

De olie is alleen geschikt voor oraal gebruik. Start volgens onderstaand opbouwschema. Verhoog op geleide van effect het aantal druppels. Het gebruik kan per individu anders zijn. De cannabis plant is een natuurproduct waardoor er variaties kunnen ontstaan bij het telen. Het gehalte CBD en THC per flesje verandert niet.

Voorbeeld opbouwschema (LET OP! U kunt stoppen met opbouwen bij de dosering waarbij u de meeste verlichting van uw klachten ervaart. Maximaal 3x per dag 0,25 ml):

Dag 1-2: Dag 3-4: Dag 5-6: Dag 7-8: Dag: 9 en verder:	<u>Met doseerspuitje</u> 2-3 keer daags 0,05 ml 2-3 keer daags 0,1 ml 2-3 keer daags 0,15 ml 2-3 keer daags 0,20 ml Etc. Maximale hoeveelheid per dag: 3 maal 10 druppels Of 3 maal per dag 0.25 ml
Dag 1-2: Dag 3-4: Dag 5-6: Dag 7-8: Dag: 9 en verder:	<u>Met druppelpipet</u> 2-3 keer daags 1-2 druppel(s) 2-3 keer daags 2-3 druppels 2-3 keer daags 3-4 druppels 2-3 keer daags 4-5 druppels etc. Maximale hoeveelheid per dag: 3 maal 10 druppels Of 3 maal per dag 0.25 ml

Zie paragraaf 9 voor instructie bij doseren in druppels of met een spuit

Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml bij epilepsie; 10% = 100 mg/ml

De startdosering voor kinderen is 0.5 mg/kg/dag verdeeld over 2 giften. Voor volwassenen starten met 0,2 mg/kg/dag verdeeld over 2 giften. Op geleide van effect kan de dosering worden verhoogd. Volwassenen mogen naar max 25 mg/kg/dag verdeeld over 2 giften. In onderstaande schema's vindt u een voorbeeld voor kinderen (schema 1) en voor volwassenen (voorbeeld 2) De olie wordt onder de tong gebracht. De cannabis plant is een natuurproduct waardoor er variaties kunnen ontstaan bij het telen. Het gehalte CBD per flesje verandert niet.



Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% olie, 10 ml
Voor sublinguaal gebruik

Voorbeeld opbouwschema 1 kinderen :

Week 1:	0,5 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
Week 2:	1 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
Week 3:	2 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
Week 4:	3 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
Week 5:	4 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses
Vanaf week 6:	5 mg/kg/dag verdeeld over 2 doses De neuroloog bepaalt of de dosering verder verhoogd dient te worden.

Voorbeeld opbouwschema 2 volwassenen :

Dag 1-3:	2x per dag 0,05 ml
Dag 4-6:	2x per dag 0,1 ml
Dag 7-10:	2x per dag 0,15 ml
Dag 11-13:	2x per dag 0,2 ml
Dag 14-17:	2 x per dag 0,25 ml
Dag 18 en verder:	eventueel verder ophogen met 0,05 ml

Zie paragraaf 9 voor het doseren in druppels of met een spuit

Hoe lang werkt het?

Het effect treedt snel (binnen 30 min) op, is maximaal na 2-3 uur en houdt 4-8 uur aan. Dit kan echter per individu verschillen. Na 6-7 dagen zijn alle stoffen uit het lichaam.

Hoe lang moet ik dit middel blijven gebruiken?

Gebruik de medicinale cannabis zolang u klachten heeft. Als u na 1 tot 2 weken gebruik geen verbetering van de klachten merkt, overleg dan met uw arts of apotheker. Het kan zijn dat de dosering moet worden verhoogd of dat u een andere variëteit moet gaan gebruiken. Het kan ook zijn dat u geen baat heeft bij het gebruik van cannabis.

Heeft u teveel van de cannabis olie gebruikt?

Het duurt 4-8 uur voordat het effect is uitgewerkt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is niet erg als u een dosis mist. Maar als u het medicijn al enkele weken gebruikt in een hoge dosering, kunt u misschien ontwenningverschijnselen krijgen.

- Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog. Wacht 8 uur voor u de volgende dosis gebruikt.
- Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: neem de vergeten dosis alsnog. Wacht 4 uur voor u de volgende dosis neemt.

5. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan medicinale cannabis bijwerkingen geven. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na enkele uren vanzelf. Patiënten verdragen medicinale cannabis in het algemeen goed. Bijwerkingen treden vooral op bij gebruik van hogere doseringen of bij gelijktijdig gebruik met een middel dat de bijwerkingen versterkt (bijvoorbeeld alcohol). Meestal zijn lage doseringen al voldoende, daarom komen bijwerkingen relatief weinig voor. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Bedica olie; Bedrocan olie; Bediol olie

Regelmatig (>0,3%): 'High'-gevoel, dit is een vrolijke, opgewekte stemming die langzaam overgaat in een tevreden gevoel van kalmte en rust. Ook loomheid, honger, intensere beleving van kleuren en muziek, en verlies van gevoel voor tijd en plaats kunnen optreden.

Soms (0,1% tot 0,3%): Sombere stemming vooral bij ouderen, en een gevoel van angst, paniek en verwarring. Dit treedt vooral op wanneer de dosering te hoog is of als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Zorg er daarom voor dat u op een rustige plek zit en er iemand bij u is als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Cannabis kan bestaande **psychische klachten** verergeren, zoals schizofrenie (psychose). U kunt dan hallucinaties (waandenkbeelden) krijgen. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van deze klachten voordat u het gaat gebruiken. **Rusteloosheid** en slapeloosheid. Raadpleeg uw arts als u veel last hebt van deze bijwerkingen.

Zelden (0,01% tot 0,1%): Duizeligheid, hoofdpijn, warme of koude handen en voeten, rode branderige ogen en een droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren weer voorbij.

Hartkloppingen, snelle hartslag, **verhoging van de bloeddruk**, pijn op de borst. In zeldzame gevallen kan hierdoor een hartinfarct ontstaan. Als u last heeft van **angina pectoris (hartkramp)** kunnen de klachten verergeren. Waarschuw dan een arts. De bijwerkingen op



Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% olie, 10 ml
Voor sublinguaal gebruik

het hart nemen binnen 1 uur weer af. Mensen met de aangeboren hartritmestoornissen **verlengde QT-interval** of het **Brugada-syndroom** kunnen meer last krijgen. Als u een van deze aandoeningen heeft, mag u dit medicijn NIET gebruiken.

Zeer zelden (<0,01%): Bij langdurig en vaak gebruiken van hoge(re) doseringen: **kans op verslaving** of **geestelijke afhankelijkheid**. Bij stoppen kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals misselijkheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid.

Bedrolite olie

Over de bijwerkingen van CBD is nog niet zoveel bekend. U wordt niet 'high' door CBD.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid treedt in het algemeen niet op als u cannabis alleen als medicijn gebruikt. U gebruikt medicinale cannabis meestal in een lagere dosering dan bij recreatief gebruik van cannabis. Wel moet u voorzichtig zijn als bij u al eerder sprake was van afhankelijkheid. Langdurig gebruik van hoge doseringen cannabis kan leiden tot afhankelijkheid. Stoppen kan dan ontwenningsverschijnselen veroorzaken, zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid.

Voor zover bekend is het vooral THC dat voor verslavende effecten zorgt. Afhankelijkheid wordt hier niet verwacht.

6. Mag ik cannabis olie gebruiken met andere medicijnen?

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een **gele waarschuwingssticker** geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.

De cannabinoïden in de cannabis olie worden in de lever omgezet. Bepaalde medicijnen kunnen daarom een wisselwerking hebben met cannabis. Ook het drinken van grapefruitsap kan de omzetting van de cannabinoïden in de lever verminderen. Grapefruitsap dient daarom vermeden te worden.

U mag cannabis alleen in combinatie met bloedverdunners gebruiken zoals acenocoumarol en fenprocoumon indien u onder controle bent van de trombosedienst.

Cannabis olie heeft mogelijk een wisselwerking met fenytoïne en carbamazepine. De combinatie kan alleen worden toegepast indien u wordt gemonitord door een neuroloog. De apotheker controleert of de cannabis olie samen met de rest van uw medicatie gebruikt mag worden.



Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5% olie, 10 ml
Voor sublinguaal gebruik

7. Hoe bewaart u medicinale cannabis olie?

Bewaar medicinale cannabis olie buiten het zicht en bereik van kinderen. De cannabisolie kan zowel op koelkast- als kamertemperatuur (minimaal 2 °C en maximaal 25 °C) worden bewaard. Gebruik de cannabis olie niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. De houdbaarheidsdatum is te vinden op het gebruiksetiket op de verpakking. Vraag uw apotheker wat u moet doen met de medicinale cannabis die u niet meer gebruikt.

8. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stoffen van medicinale cannabis zijn THC en/of CBD. Kijk op het etiket welke werkzame stoffen in de olie aanwezig zijn. Bedrolite bevat geen THC.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn geraffineerde arachideolie (pindaolie).

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Cannabis olie is een bruin tot zwarte olie.

De olie is per 10 ml verpakt in een bruine glazen flacon met druppeldop of doseer dop.

Bedica en Bedrocan THC 2,0% olie bevat 20 mg THC per ml
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie bevat 20 mg CBD per ml en 13 mg THC per ml
Bedrolite CBD 2,0% olie bevat 20 mg CBD per ml
Bedrolite CBD 10% olie bevat 100 mg CBD per ml
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, bevat 100 mg THC per ml en 50 mg CBD per ml.

9.0 Dosereren cannabisolie

De cannabisolie wordt geleverd met een 1 ml spuit of druppeldop. U kunt met de spuit in ml doseren en met de druppeldop druppelen. Op uw etiket staat aangegeven wat het gebruik is.

9.1 Druppelen met de (blauwe) druppeldop:

Draai de dop van het flesje, haal de doorzichtige inlage eruit en draai de blauwe druppelaar op de flacon. Draai het witte dopje van het blauwe rubbertuitje. Breng het aantal druppels op een lepel door zacht in het rubber te knijpen en breng over onder de tong.

9.2 Optrekken van cannabisolie in de bijgeleverde spuit

Stap 1 Draai de schroefdop van het flesje

Stap 2 Schuif de bijgeleverde spuit in het flesje.

Stap 3 Hou het flesje onderste boven.

Stap 4 Trek het aantal ml op zoals aangegeven op het etiket.

Stap 5 Spuit de inhoud van de spuit leeg onder de tong.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2018.