

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569	Transvaal.apotheek@inter.nl.net	Geneesmiddeleninformatieblad
Fenelzine 15 mg tabletten Voor oraal gebruik		Pagina 1 van 6 Revisie: 1 Opgesteld door: AR



FENELZINE (ALS SULFAAT) 15 MG TABLETTEN

Lees de hele bijsluiter goed vóóordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 2 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?
3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?
4. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
5. Als ik dit geneesmiddel gebruik, mag ik dan.....?
6. Heeft dit geneesmiddel een wisselwerking met andere geneesmiddelen?
7. Kan ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
8. Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
9. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

1. Waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Fenelzine regelt in de hersenen de hoeveelheid van onder andere serotonine en noradrenaline. Dit zijn twee natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

Artsen schrijven het voor bij sommige vormen van **depressie, paniekstoornis, posttraumatische stresstoornis en sociale fobie.**

Depressie Verschijnselen

Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben.

Werking

Uw arts zal fenelzine alleen voorschrijven als andere middelen onvoldoende werken. Met een zogenaamde artsenverklaring is fenelzine dan via de apotheek leverbaar. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit middel voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het wordt dan via de apotheek geleverd.

Fenelzine wordt ook voorgeschreven bij depressies waar vooral toegenomen eetlust, toegenomen slaapbehoefte, ernstige vermoeidheid en angst voor afwijzing de belangrijkste klachten zijn.

Het kan twee tot zes weken duren voordat u het effect merkt. Het is belangrijk het middel na verbetering van de verschijnselen nog minstens een half jaar te blijven gebruiken. Daarmee verkleint u de kans dat de depressie terugkomt. Bij ouderen en mensen die eerder een depressie hebben gehad adviseren artsen vaak om dit medicijn langer te gebruiken.

Consequent gebruiken

Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Paniekstoornis Verschijnselen

Bij een paniekstoornis heeft u ongewoon sterke aanvallen van paniek. U krijgt dan allerlei lichamelijke verschijnselen, zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid, slappe benen en hartkloppingen. U kunt tijdens een aanval het gevoel krijgen dat u doodgaat of gek wordt.

Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last, maar bij een paniekstoornis heeft u ongewoon sterke aanvallen van paniek. De aanvallen beheersen dan uw leven. Ook kunt u een voortdurende angst hebben om opnieuw een paniekaanval te krijgen.

Sommige mensen proberen de situatie waarin een paniekaanval ontstaat te vermijden. Soms lukt het niet meer te gaan werken of naar buiten te gaan (straatvrees) uit angst voor een nieuwe aanval.

Behandeling

Iedereen heeft wel eens een lichte mate van paniek ervaren, maar als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen.

De behandeling van een paniekstoornis bestaat uit gesprekken met een arts of psycholoog (gesprekstherapie). Vaak wordt deze gesprekstherapie gecombineerd met een antidepressivum. Uw arts zal fenelzine alleen voorschrijven als andere medicijnen

Afdeling: Bereidingen	Opsteldatum: 13-01-2016	Autorisatie: NC	Autorisatiedatum: 01-04-2017
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569	Transvaal.apotheek@inter.nl.net	Geneesmiddeleninformatieblad
Fenelzine 15 mg tabletten Voor oraal gebruik		Pagina 2 van 6 Revisie: 1 Opgesteld door: AR



tegen paniekstoornis onvoldoende werken. Het heeft namelijk meer bijwerkingen dan andere middelen tegen paniekstoornissen.

Effect

Het kan 2 tot 6 weken duren voordat u het effect van fenelzine merkt. De eerste weken kunt u wel last krijgen van de bijwerkingen. Stop dan niet met dit medicijn. Meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als het medicijn bij u helpt, adviseert uw arts meestal om het langdurig (meerdere jaren) te gebruiken.

Posttraumatische stressstoornis

Verschijselen

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) kan ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Bijvoorbeeld een bedreiging, een verkrachting, een ramp of een ongeluk. Als het niet lukt dit te verwerken, kan iemand een posttraumatische stressstoornis krijgen. Dit kan direct na de traumatische gebeurtenis beginnen, of pas veel later.

Men krijgt dan verschijnselen van toegenomen angst of spanning die er voor de traumatische gebeurtenis niet waren, bijvoorbeeld slecht slapen, concentratieproblemen of heftige schrikreacties. Ook beleeft men details van de gebeurtenis vaak opnieuw in de vorm van nachtmerries of herinneringen die men niet uit het hoofd kan zetten.

Behandeling

Om de traumatische gebeurtenis te verwerken, kunnen gesprekken met een psychiater of psycholoog (psychotherapie) helpen. Vaak wordt deze therapie gecombineerd met een antidepressivum. Uw arts zal fenelzine alleen voorschrijven als andere medicijnen tegen PTSS onvoldoende werken. Het heeft namelijk meer bijwerkingen dan andere middelen tegen PTSS.

Effect

Het kan 2 tot 6 weken duren voordat u het effect van fenelzine merkt. De eerste weken kunt u wel last krijgen van de bijwerkingen. Stop dan niet met dit medicijn. Meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan dit medicijn. Als het medicijn bij u helpt, adviseert uw arts meestal om het langdurig (meer dan 1 jaar) te gebruiken.

Sociale fobie

Verschijselen

Bij een sociale fobie hebben mensen een extreme en ongegronde angst voor kritiek van anderen. Men heeft daarbij last van lichamelijke verschijnselen, zoals trillen, zweten, blozen en hartkloppingen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

Behandeling

Een sociale fobie wordt meestal behandeld door gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie). Dit werkt bij drie op de vier mensen. Uw arts kan in sommige gevallen een behandeling met fenelzine proberen. Met een zogenaamde artsenverklaring is fenelzine dan via de apotheek leverbaar.

Effect

U merkt het effect van fenelzine niet meteen. Ondanks dat kunt u wel meteen na het begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met het gebruik, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

2. Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Bijwerkingen treden niet bij iedereen op, maar alleen bij personen die daar gevoelig voor zijn. De meeste bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het medicijn stopt. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende;

Regelmatig, vooral de eerste tijd dat u dit middel gebruikt

- **Duizeligheid**, vooral bij het opstaan. Heeft u hier last van of bent u licht in het hoofd, dan kan dit erop wijzen dat uw bloeddruk is verlaagd. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit middel de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
- **Moeite om in of door te slapen**. Soms helpt het om de laatste dosis van de dag voor 3 uur 's middags in te nemen.
- **Seksuele stoornissen**, zoals minder zin in vrijen, moeilijke erectie en te late zaadlozing. Deze bijwerkingen gaan over als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

Afdeling: Bereidingen	Opsteldatum: 13-01-2016	Autorisatie: NC	Autorisatiedatum: 01-04-2017
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569	Transvaal.apotheek@inter.nl.net	Geneesmiddeleninformatieblad
Fenelzine 15 mg tabletten Voor oraal gebruik		Pagina 3 van 6 Revisie: 1 Opgesteld door: AR



Soms

- Hoofdpijn, hoge bloeddruk, spierpijn, spierschokken.
- Lijdt u aan **hartkramp (angina pectoris)** dan kan pijn op de borst bij inspanning onopgemerkt blijven, terwijl er wel schade aan het hart optreedt door zuurstoftekort. Raadpleeg uw arts als u lijdt aan angina pectoris.

Zelden

- **Droge mond.** Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
- **Maagdarmklachten**, zoals misselijkheid en diarree. Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt.
- **Sufheid**, slaperigheid, vermoeidheid, een verminderd reactievermogen en wazig zien. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van processen op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten de eerste week van de behandeling. U moet dan nog aan het middel wennen. Kijk daarna hoe u op dit middel reageert.
- Lichte **hoofdpijn**.

- Huiduitslag en jeuk.
- Na enkele maanden: **gewichtstoename**. Let daarom goed op wat en hoeveel u eet. Vraag uw huisarts om een verwijzing naar een diëtist als u te veel aankomt.
- **Verwardheid**, onrust en angst. Vooral mensen die zelf al verward zijn of die lijden aan manische depressiviteit zijn hier gevoelig voor.
- **Moeilijk kunnen plassen**. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
- Bij mensen met **epilepsie** kan een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.

Zeer zelden

- **Plotselinge ernstige verhoging van de bloeddruk**. Dit merkt u aan ernstige bonzende hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, wazig zien, pijn op de borst en hartkloppingen. Als u dit merkt moet u direct contact opnemen met uw arts. Deze bijwerking treedt alleen op als u tyraminerijk voedsel of drank nuttigt. Vermijd daarom tyraminerijk voedsel en drank. Tyraminerijk voedsel is bijvoorbeeld oude gerijpte kaas, camembert, brie, biergist en marmite. Tyraminerijke drank is bijvoorbeeld witbier, zware bieren zoals Belgisch bier en tapbier, champagne en chiantiwijn. Het is ook belangrijk dat u vers vlees en vis eet. Deze mag u niet lang bewaren. De bacteriën in het vlees en vis zetten eiwitten om in tyramine. Hoe langer u het bewaart, hoe meer tyramine erin zit. Van voeding met weinig tyramine mag u

kleinere hoeveelheden eten. Overleg hierover met uw diëtist. Uw diëtist kunt u een compleet voedingsadvies geven.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

3. Hoe gebruikt u dit geneesmiddel?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?

Verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag. U kunt fenelzine het beste innemen tijdens of vlak na het eten, u heeft dan de minste kans op misselijkheid.

Hoe lang?

- **Depressie:** na 2 tot 6 weken kunt u een stemmingsverbetering verwachten. Merk u na die periode te weinig effect, dan kan uw arts de dosis verhogen. Na verbetering van de klachten moet u het meestal 6 maanden blijven gebruiken. Dan heeft u minder kans dat de depressiviteit terugkomt.
- **Sociale fobie:** als het middel na 3 maanden nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Overleg hierover met uw arts.

Afdeling: Bereidingen	Opsteldatum: 13-01-2016	Autorisatie: NC	Autorisatiedatum: 01-04-2017
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------

Transvaal Apotheek, Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag, Tel. 070-3469314, Fax: 070-3453569	Transvaal.apotheek@inter.nl.net	Geneesmiddeleninformatieblad
Fenelzine 15 mg tabletten Voor oraal gebruik		Pagina 4 van 6 Revisie: 1 Opgesteld door: AR



4. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

- U gebruikt dit middel **drie keer per dag**: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.

5. Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan... autorijden?

Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid en slechter zien. U mag de **eerste week** dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende 1 week dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden.

Na een week zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Let op: ook depressiviteit of ernstige paniekaanvallen kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het [CBR](#).

Voor meer algemene informatie kunt u het thema '[Medicijnen in het verkeer](#)' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?

Alcohol versterkt de duizeligheid en het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

alles eten?

Nee, vermijd tyraminerijk voedsel en drank. U kunt een ernstige bloeddrukverhoging krijgen. Dit merkt u aan ernstige bonzende hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, wazig zien, pijn op de borst en hartkloppingen. Als u dit merkt moet u direct contact opnemen met uw arts. Tyraminerijk voedsel is bijvoorbeeld oude gerijpte kaas, camembert, brie, biergist en marmite. Tyraminerijke drank is bijvoorbeeld witbier, zware bieren zoals Belgisch bier en tapbier, champagne en chiantiwijn. Het is ook belangrijk dat u verse vlees en vis eet. Deze mag u niet lang bewaren. De bacteriën in het vlees en vis zetten eiwitten om in tyramine. Hoe langer u het bewaart, hoe meer tyramine erin zit. Van voedsel met weinig tyramine mag u kleinere hoeveelheden eten. Overleg dit met uw diëtist. Uw diëtist kunt u een compleet voedingsadvies geven.

6. Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiting onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

- Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een **gele waarschuwingssticker** geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
- Sommige andere **middelen tegen depressie**, namelijk citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, clomipramine, imipramine, duloxetine, trazodon en venlafaxine. Deze middelen kunnen niet veilig met fenelzine worden gebruikt, omdat dan een ernstige bijwerking kan optreden. U kunt dan last krijgen van spiertrekkingen, trillen, koorts, zweten, opgewondenheid en verwardheid. Ook als u al gestopt bent met fenelzine duurt het twee weken voor u een ander middel tegen depressie veilig kunt gebruiken. Andersom duurt het enkele dagen tot weken voor u, na stoppen met een ander middel tegen depressie, met fenelzine mag beginnen. Raadpleeg hierover uw arts of apotheker.
- Sommige **middelen bij ADHD, narcolepsie en sommige afslankmiddelen** kunnen in combinatie met fenelzine een plotseling ernstig verhoogde bloeddruk veroorzaken. Dit betreft middelen met amfetamine, dexamfetamine of methylfenidaat. Gebruik deze medicijnen niet. Vraag uw arts of apotheker eventueel om advies over de samenstelling van een (afslank)middel.
- Gebruik **GEEN** hoestmiddel met het hoestprikkelende middel **dextromethorfan**. De combinatie kan ernstige bijwerkingen geven.

Afdeling: Bereidingen	Opsteldatum: 13-01-2016	Autorisatie: NC	Autorisatiedatum: 01-04-2017
-----------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------

Fenelzine 15 mg tabletten
Voor oraal gebruik

Pagina 5 van 6
Revisie: 1
Opgesteld door: AR



- Gebruik **NIET** de pijnstillers **fantanyl** en **pethidine**. Combinatie met fenelzine kan tot ernstige bijwerkingen leiden.
- De pijnstillers **oxycodon** en **tramadol**. In combinatie met fenelzine is er een kleine kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom. Overleg hierover met uw arts. Als u de combinatie gebruikt, let dan op de verschijnselen, zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.
- **Dopamine, efedrine en fenylefrine** kunnen in combinatie met fenelzine een sterke stijging van de bloeddruk geven.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts. Vertel uw arts altijd dat u fenelzine gebruikt.

7. Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Bij gebruik tegen depressie

Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap kan het kind ontweningsverschijnselen krijgen na de geboorte. De moeder kan last krijgen van hoge bloeddruk. Bovendien zijn er niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Maar depressieve klachten kunnen ook schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

- Krijgt u dit medicijn voor het eerst en wilt u zwanger worden of bent u zwanger? Overleg dan met uw arts voordat u met dit medicijn begint. U kunt dan namelijk beter meteen met een ander medicijn beginnen. Bijvoorbeeld een medicijn uit de groep serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals fluoxetine. Of een tricyclische antidepressiemiddel (TCA), zoals amitriptyline. Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap.
- Gebruikt u dit medicijn al en wilt u zwanger worden? Overleg dan eerst met uw arts. Misschien kunt u beter overstappen op een ander medicijn. Bijvoorbeeld een medicijn uit de groep serotonineheropnameremmers (SSRI's), zoals fluoxetine. Of een tricyclische antidepressiemiddel (TCA), zoals amitriptyline. Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens zwangerschap.
- Gebruikt u dit medicijn al en bent u zwanger geworden? Overleg dan meteen met uw arts. Stoppen met dit medicijn of overstappen op een ander medicijn wordt meestal niet aangeraden. Terugkeer van de depressieve

klachten kan schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Samen met uw arts kunt u bespreken wat het risico voor u en de baby is als u doorgaat met het medicijn.

Bij andere toepassingen

Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap kan het kind ontweningsverschijnselen krijgen na de geboorte. De moeder kan last krijgen van hoge bloeddruk. Bovendien zijn er niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of het in de moedermelk terecht komt en of het schadelijk is voor de baby.

Bij gebruik tegen depressie

Misschien kan de arts een medicijn uit de groep SSRI's of een TCA voorschrijven. Met de medicijnen uit deze groepen is namelijk meer ervaring bij gebruik tijdens borstvoeding.

8. Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, u mag niet plotseling met dit middel stoppen. De dosering moet u geleidelijk afbouwen, anders kunt u last krijgen van slaapproblemen, prikkelbaarheid, angst en andere gedrags- en gevoelsproblemen. Gaat u stoppen, dan zal uw arts een afbouwschema opstellen.

Als u dit middel gebruikt tegen een **depressie**: wees erop bedacht dat het effect van fenelzine pas na een aantal weken maximaal is en dat u het middel daarna

Fenzine 15 mg tabletten
Voor oraal gebruik

Pagina 6 van 6
Revisie: 1
Opgesteld door: AR



nog minstens zes maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u meer kans dat de depressiviteit terugkomt.

9. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?

- De werkzame stof in dit geneesmiddel is fenelzine sulfaat.
- De andere stoffen in dit geneesmiddel zijn natriumcarboxymethylzetmeel, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, siliciumdioxide en talk.

Hoe ziet dit geneesmiddel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Fenzine 15 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten van 9 millimeter in doorsnee. De tabletten zijn verpakt per 90 stuks in een tablettencontainer met sluitdop.

Deze geneesmiddelinformatie wordt uitgegeven door de Transvaal Apotheek

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op april 2017.