

BEDIOL ZALF

In deze bijsluiter staat belangrijke informatie over Bediol zalf. Lees voor gebruik de hele bijsluiter door en bewaar hem goed. Geef het medicijn niet door aan anderen, want het kan schadelijk voor hen zijn. Neem contact op met de Transvaal apotheek als u last krijgt van een bijwerking of vragen heeft.

INHOUD

1. Medicinale cannabis: wat is het?
2. Wat is Bediol zalf en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?
3. Wanneer mag u Bediol zalf niet gebruiken?
4. Hoe gebruikt u bediol zalf?
5. Mogelijke bijwerkingen
6. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
7. Inhoud van de verpakking

1. Medicinale cannabis: wat is het?

Cannabis bestaat uit de gedroogde bloemen van de vrouwelijke plant van *Cannabis sativa* L (hennepplant). Er wordt een onderverdeling gemaakt in cannabis sativa en cannabis indica soorten. Andere namen voor cannabis zijn marihuana of wiet. Cannabis bevat verschillende werkzame bestanddelen, zoals dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD). THC is meestal het hoofdbestanddeel, maar ook de andere inhoudsstoffen, zoals CBD kunnen een bijdrage leveren aan de werkzaamheid. Cannabis die via de apotheek verstrekt wordt, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is alleen bedoeld voor gebruik als medicijn. Daarom spreken we over medicinale cannabis.

2. Wat is Bediol zalf en waarvoor wordt dit geneesmiddel gebruikt?

Er zijn aanwijzingen dat het lokaal toepassen van CBD en THC ontstekingsremmende en pijn verlichtende effecten geeft. De zalf kan gebruikt worden bij (pijn door) artritis, jeuk of bij bepaalde dermatologische condities. Tevens kan het de wond genezing bevorderen. De aandoening die de verschijnselen veroorzaakt wordt echter niet genezen.

3. Wanneer mag u Bediol zalf niet gebruiken?

Gebruik Bediol zalf niet:

- als u bekend bent met overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen of hulpstoffen (zie rubriek 7).
- bij huidinfecties veroorzaakt door bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten.
- op open wonden.
- In het oog of op de oogleden.
- Op de geslachtsdelen.
- In neus, oor of mondholten.

Zwangerschap

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Werkzame bestanddelen van cannabis kunnen via het bloed het ongeboren kind bereiken. Sommige kinderen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft gebruikt, hebben groeiachterstand, problemen met slapen, zijn hyperactief of hebben concentratieproblemen.

Borstvoeding

Gebruik dit middel niet als u borstvoeding geeft of stop de borstvoeding. Werkzame bestanddelen zoals dronabinol (THC) komen in de moedermelk terecht en kunnen dan bijwerkingen bij de baby geven.

4. Hoe gebruikt u bediol zalf?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voordat u begint met de behandeling:

Minimaal 48 uur voor het starten van de zalf volgens voorschrift, moet u cannabiszalf eerst twee keer op de huid te testen om er zeker van te zijn dat u niet allergisch bent voor dit middel. Deze test voert u uit door op de eerste dag een halve centimeter (ongeveer een stip) aan te brengen op de elleboogholte (binnenzijde van de arm) en dit na 24 uur weer te herhalen. Krijgt u tot 24 uur na de tweede keer aanbrengen geen last van jeuk, roodheid of andere allergische reacties? Dan kunt u gerust beginnen met het gebruiken van de zalf op de hiervoor bedoelde plekken. Krijgt u wel last van een allergische reactie? Dan adviseren we om de zalf niet te gebruiken en eventueel contact op te nemen met uw arts of de apotheker.

Hoe gebruikt u Bediol zalf?



Geproduceerd door: Transvaal apotheek
Kempstraat 113, 2572 GC Den Haag

E: cannabis@transvaalapotheek.nl
T: 070-3469314

De aanbevolen dosering is 2 tot 3 keer per dag dun aanbrengen op de te behandelen plekken. Niet vaker dan 3 keer per dag gebruiken, tenzij uw arts anders voorschrijft. De behandelingsperiode is afhankelijk van uw klachten en wordt door uw arts bepaald. In geval u merkt dat Bediol zalf te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Ben u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u één keer vergeten bent de zalf aan te brengen, kunt u gewoon verder gaan met de zalf zoals u gewend bent. Breng geen dubbele dosis aan om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Mogelijke bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan medicinale cannabis bijwerkingen geven. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na enkele uren vanzelf. Patiënten verdragen medicinale cannabis in het algemeen goed. Bijwerkingen treden vooral op bij gebruik van hogere doseringen of bij gelijktijdig gebruik met een middel dat de bijwerkingen versterkt (bijvoorbeeld alcohol). Meestal zijn lage doseringen al voldoende voor de werking van dit middel, daarom komen bijwerkingen relatief weinig voor. De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig: Allergische huidreactie (jeuk, roodheid, bultjes of zwellingen). Let op! Krijgt u last van deze klachten? Stop dan onmiddellijk met het gebruik en waarschuw uw arts en de Transvaal Apotheek.

Soms: Sombere stemming, vooral bij ouderen, en een gevoel van angst, paniek en verwarring. Dit treedt vooral op wanneer de dosering te hoog is of als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Zorg er daarom voor dat u op een rustige plek zit en er iemand bij u is als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Cannabis kan bestaande psychische klachten verergeren, zoals schizofrenie (psychose). U kunt dan hallucinaties (waandenkeelden) krijgen. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van deze klachten voordat u het gaat gebruiken. Rusteloosheid en slapeloosheid. Raadpleeg uw arts als u veel last hebt van deze bijwerkingen.

Zelden: 'High'-gevoel, dit is een vrolijke, opgewekte stemming die langzaam overgaat in een tevreden gevoel van kalmte en rust. Ook loomheid, honger, intensere beleving van kleuren en muziek, en verlies van gevoel voor tijd en plaats kunnen optreden. Duizeligheid, hoofdpijn, warme of koude handen en voeten, rode branderige ogen en een droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren weer voorbij. Hartkloppingen, snelle hartslag, verhoging van de bloeddruk, pijn op de borst. In zeldzame gevallen kan hierdoor een hartinfarct ontstaan. Als u last heeft van angina pectoris (hartkramp) kunnen de klachten verergeren. Waarschuw dan een arts. De bijwerkingen op het hart nemen binnen 1 uur weer af. Mensen met de aangeboren hartritmestoornissen verlengde QT-interval of het Brugada-syndroom kunnen meer last krijgen. Als u een van deze aandoeningen heeft, mag u dit medicijn NIET gebruiken.

Zeer zelden: Bij langdurig en vaak gebruiken van hoge(re) doseringen: kans op verslaving of geestelijke afhankelijkheid. Bij stoppen kunnen er ontweningsverschijnselen ontstaan, zoals misselijkheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

6. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Zorg dat kinderen niet bij de Bediol zalf kunnen. Bewaar de zalf tussen 15°C en 25 °C. Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze staat op de verpakking. Vraag uw apotheker wat u moet doen met de zalf die u niet meer gebruikt.

7. Inhoud van de verpakking

Bediol zalf bevat als werkzame bestanddelen CBD 1,0% en THC 0,65%. De hulpstoffen zijn witte vaseline, colloïdaal siliciumdioxide en geraffineerde arachideolie. De zalf is groen tot donkerbruin van kleur. De zalf is per 20 gram verpakt in een tube met omdoos.

